

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-049286

(43)Date of publication of application : 20.02.2001.

(51)Int.Cl.

C11B 9/00

A61K 7/46

(21)Application number : 11-221887

(71)Applicant : POLA CHEM IND INC

(22)Date of filing : 05.08.1999

(72)Inventor : TANIZAWA SHIGEJI

SUGA CHIHOKO

GOTO MASAHIRO

OKUDA TAKEHIRO

ISHIDOYA TOYOMASA

(54) PERFUME COMPOSITION FOR STRESS RELAXATION AND COMPOSITION CONTAINING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a perfume composition excellent in stress relaxation action, especially in relaxing the stress due to lack of sleep, by using at least one compound selected from among nerolidol, hedion, mayol, lilial, helional, phenylethyl alcohol, and  $\alpha$ -hexylcinnamic aldehyde.

SOLUTION: The compound is compounded into a perfume composition used for perfuming cosmetics or fragrance products. When two or more compounds are combined, a composition containing ingredients, each in an amount of 5 to 15 wt.%, exhibits an especially remarkable action. Preferably, the composition is adjusted to a perfume of the so-called aquafloral note. In order to impart a perfume of the aquafloral note, nerolidol, hedion, mayol, or lilial is mixed with the same amount of helional or the like, or phenylethyl alcoholol is mixed with almost the same amount of  $\alpha$ -hexylcinnamic aldehyde.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-49286

(P2001-49286A)

(43) 公開日 平成13年2月20日 (2001.2.20)

(51) Int.Cl.

識別記号

F I

キーワード(参考)

C 1 1 B 9/00

C 1 1 B 9/00

C 4 H 0 5 9

D

K

T

X

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 5 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願平11-221887

(22) 出願日

平成11年8月5日 (1999.8.5)

(71) 出願人 000113470

ポーラ化成工業株式会社

静岡県静岡市弥生町6番48号

(72) 発明者 谷沢 茂治

神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地1

ポーラ横浜研究所内

(72) 発明者 菅 千帆子

神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地1

ポーラ横浜研究所内

(72) 発明者 後藤 正弘

神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地1

ポーラ横浜研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ストレス緩和用の香料組成物及びそれを含有する組成物

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、誰もが簡単にできるストレスの緩和手段、取り分け睡眠不足のストレス緩和手段を提供することを課題とする。

【解決手段】 ネロリドール、ヘディオン、マイヨール、リリアル、ヘリオナル、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒドから選ばれる1種乃至は2種以上を含むことを特徴とする、ストレス緩和用の香料組成物を化粧品などの化粧品に含有させる。

**【特許請求の範囲】**

【請求項1】 ネロリドール、ヘディオ、マイヨール、リリアル、ヘリオール、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒドから選ばれる1種乃至は2種以上を含むことを特徴とする、ストレス緩和用の香料組成物。

【請求項2】 香の基調がアクアフローラルであることを特徴とする、請求項1に記載のストレス緩和用の香料組成物。

【請求項3】 ネロリドール、ヘディオ、マイヨール、リリアル、ヘリオール、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒドから選ばれる1種乃至は2種以上の含有量が、香料成分全量に対して60%以上であることを特徴とする、請求項1又は2に記載のストレス緩和用の香料組成物。

【請求項4】 ストレスが睡眠不足であることを特徴とする、請求項1～3の何れか1項に記載のストレス緩和用の香料組成物。

【請求項5】 請求項1～4何れか1項に記載のストレス緩和用の香料組成物を含有することを特徴とする、化粧品。

【請求項6】 化粧料又はフレグランスであることを特徴とする、請求項5に記載の化粧品。

【請求項7】 ストレス緩和用であることを特徴とする、請求項5又は6に記載の化粧品。

【請求項8】 ネロリドール、ヘディオ、マイヨール、リリアル、ヘリオール、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒドから選ばれる1種乃至は2種以上を含有する、ストレス緩和用の化粧料又はフレグランス。

**【発明の詳細な説明】****【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明は、化粧料やフレグランスに好適な香料組成物及びそれを含有する化粧品に関する。

**【0002】**

【従来の技術】 近年はストレス社会であり、そこに生きる現代人は多かれ、少なかれ何かのストレスの負荷の元に生きている。この様なストレスは、人間生活に少なからぬ影響を与え、例えば、免疫力の低下、癌の発生率の増加、ノイローゼなどの精神的障害の増加と言った、病態に関することから、体調の不調、疲労感、やる気の消失と言った未病に至るまで、人間生活の不都合の大きな原因となっている。この様なストレスの中で特に重篤なものは、睡眠不足によるストレスである。これは、社会生活の夜型への移行や残業の急増に見られる労働環境の悪化に伴って深刻な問題となりつつある。睡眠不足によるストレスは、睡眠不足による生理的な不調、不快感によるストレスとともに睡眠不足そのものが生体に及ぼすストレスも存在し、その影響は非常に大きいものとなる。

この様なストレスに対する対応としては、一つには必要な睡眠時間の確保が挙げられるが、ストレス負荷が多すぎると、睡眠障害を生じてしまうため、この様な必要な睡眠時間の確保は難しい場合が少なくない。この様な場合には、第一ステップとして、ストレスそのものを緩和することが必要となる。この様なストレス緩和策としては、瞑想やリラクゼーションと言ったものが知られているがこの様な技術には習熟が必要であり、誰もが簡単にできるストレスの緩和手段が求められていた。

【0003】 一方、香料成分がストレスの緩和の一助になることは古くより言われていることであるが、香料成分の何がこの様な作用を有するかは特定されていなかったし、この様な作用が再現性良く観察されたわけではなかった。更に、ネロリドール、ヘディオ、マイヨール、リリアル、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒドは香料成分として広く知られていたし、香料として使用されていたが、このものがストレス緩和作用、取り分け睡眠不足のストレス緩和作用を有することは全く知られていなかった。

**【0004】**

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、この様な状況下で為されたものであり、誰もが簡単にできるストレスの緩和手段、取り分け睡眠不足のストレス緩和手段を提供することを課題とする。

**【0005】**

【課題の解決手段】 この様な状況に鑑みて、本発明者らは、誰もが簡単にできるストレスの緩和手段を求めて鋭意研究努力を重ねた結果、ネロリドール、ヘディオ、マイヨール、リリアル、ヘリオール、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒドに優れたストレス緩和作用、しかも、睡眠不足によるストレス緩和作用に優れることを見いだした。更に検討を重ねた結果、これらの成分を組み合わせることで香料組成物に含有させ、アクアフローラル調に調香すると、更に如実な効果が得られることを見だし、発明を完成させるに至った。以下、本発明について、実施の形態を中心に更に詳細に説明を加える。

**【0006】**

【発明の実施の形態】 (1) 本発明のストレス緩和用の香料組成物

本発明のストレス緩和用の香料組成物は、ネロリドール(3, 7, 11-トリメチル-, 6, 10-ドデカトリエン-3-オール)、ヘディオ(メチルジヒドロジャスモネート)、マイヨール(シス-p-イソプロピルシクロヘキシルメタノール)、リリアル(p-ターシャリーブチルヒドロシンナミックアルデヒド)、ヘリオール( $\alpha$ -メチル-3, 4-メチレンジオキシハイドロシンナミックアルデヒド)フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒドから選ばれる1種乃至は2種以上を含有することを特徴とする。これら

の成分は何れも香料成分として広く知られており、化粧料やフレグランスで既に使用されている。これらは単独でもストレスの緩和作用を有しているし、これ自身或いは他の香料と組み合わせてもこの様な作用を発揮する。この様な作用は、これらから選ばれる2種以上を組み合わせた場合が著しく、中でもこれらの成分をそれぞれ5～15重量%づつ含有するような組成物が特に著しく、本発明では、この様な組成物を本発明のストレス緩和用の香料組成物として使用するのが特に好ましい。更には、その香の調子としては、みずみずしい花を想わせる、いわゆるアクアフローラル調のものに調香しておくのが特に好ましい。これらを組み合わせるアクアフローラル調の香に調香するには、ネロリドール、ヘディオオン、マイヨール、リリアルとヘリオナルの等量混合物、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシナミックアルデヒドを等量に近い組成比で混合しておけば良い。ここで、本発明で言う香料組成物とは、化粧料やフレグランス製品の賦香のために用いる香料を含む組成物であって、香料成分以外には、エタノールや水などの希釈媒を含有することができる。本発明の香料組成物に於ける、本発明の前記ストレス緩和用の香料成分の含有量は、40～80重量%が好ましく、50～70重量%が更に好ましい。

#### 【0007】(2) 本発明の香粧品

本発明の香粧品は、上記本発明のストレス緩和用の香料を組成物を含有することを特徴とする。本発明に於ける香粧品とは、香料組成物を含有する製品であって、化粧料やフレグランスに類似した使用形態で使用される組成物を意味し、例えば、基礎化粧料、メイクアップ化粧料、フレグランス、皮膚外用医薬等が好ましく例示できる。ここでフレグランスとしては、オーデコロン、オードトワレ、香水のみならず、ルームフレグランスや練り香、香、線香等も含んで例示できる。本発明の香粧品としては、基礎化粧料が特に好ましく、中でも使用感、或いはその含有成分としてストレスの影響を軽減できる要素を有する基礎化粧料が特に好ましい。これは、この様な化粧料に於いて相乗的に本発明の効果を発揮できるからである。特に好ましい共存成分としては、ブクリョウの抽出物が例示できる。これは、この成分が、生体の環境をストレスの負荷に負けないように整える作用を有するからである。この成分の本発明の香粧品である化粧料に於ける好ましい含有量は、0.01～0.1重量%である。本発明の香粧品に於ける、上記本発明の香料組成物の好ましい含有量は0.01～20重量%であり、更に好ましくは0.1～10重量%である。これらの香粧品を使用することにより、睡眠不足などによるストレスの影響を軽減できる。本発明の香粧品に於いては、この様な必須の成分や好ましい成分以外に、通常香粧品で使

用される任意成分を含有することができる。この様な任意成分としては、例えば、スクワラン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水素類、ホホバ油、カルナウバワックス、オレイン酸オクチルドデシル等のエステル類、オリーブ油、牛脂、椰子油等のトリグリセライド類、ステアリン酸、オレイン酸、リチノレイン酸等の脂肪酸、オレイルアルコール、ステアシルアルコール、オクチルドデカノール等の高級アルコール、スルホコハク酸エステルやポリオキシエチレンアルキル硫酸ナトリウム等のアニオン界面活性剤類、アルキルベタイン塩等の両性界面活性剤類、ジアルキルアンモニウム塩等のカチオン界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセライド、これらのポリオキシエチレン付加物、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル等の非イオン界面活性剤類、ポリエチレングリコール、グリセリン、1, 3-ブタンジオール等の多価アルコール類、増粘・ゲル化剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、色剤、防腐剤、粉体等を好ましく例示できる。これらの成分を常法に従って処理することにより、本発明の香粧品は製造することができる。

#### 【0008】

【実施例】以下に、実施例を挙げて、本発明について更に詳細に説明を加えるが、本発明が、これら実施例にのみ限定を受けないことは言うまでもないことである。

【0009】<実施例1>本発明の香料組成物を構成する、ネロリドール、ヘディオオン、マイヨール、リリアル、ヘリオナル、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシナミックアルデヒドについて、その睡眠不足ストレスの緩和作用をヒトを用いた寝不足モデル試験により確かめた。即ち、強制的に24時間睡眠を妨げて作製したヒト睡眠不足モデルに於いて、香料成分を存在させた場合と存在させなかった場合で、尿中の17-ヒドロコルチコイド量に対する17-ケトステロイド量の100分率(S/OH)を求めた。陰性対照としては、香料成分を存在させなかったものを、陽性対照としては、十分な睡眠をさせた場合を用いた。又、比較例1としてはリナロールを、比較例2としては $\alpha$ -ピネンを用いた。香料成分の使用量は、これら成分の60重量%エタノール溶液を作製し、これの0.01gを3立米の部屋に噴霧して行った。17-ヒドロコルチコイドと17-ケトステロイドの定量は、住友金属バイオサイエンス株式会社に依頼して行った。結果を表1に示す。これより、本発明の香料組成物の香料成分には優れたストレス緩和作用があることがわかる。

#### 【0010】

##### 【表1】

香料成分	S/OH	備考
ネロリドール	85	
ヘディオン	81	
マイヨール	84	
リリアール	85	
ヘリオナール	84	
フェニルエチルアルコール	88	
$\alpha$ -ヒドロキシシンナミックアルデヒド	88	
香料成分無し	77	陰性対照
睡眠充分	108	陽性対照
リナロール	78	比較例1
$\alpha$ -ビネン	78	比較例2

【0011】＜実施例2＞下記に示す処方に従って、本発明の香料組成物を作製した。即ち、処方成分を良く混合し、香料組成物1を得た。このものの香の調子はアクアフローラル調であった。これを上記のヒト睡眠不足モデルで効果を見たところ、S/OHで101であり、本発明の香料組成物としては、ネロリドール、ヘディオ、マイヨール、リリアール、ヘリオナール、フェニルエチルアルコール及び $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒドを複数混合して、更に好ましくは、これら7種が全て含む形態であることが適切であることがわかる。更に、香の調子としては、アクアフローラル調が好ましいこともわかる。

ネロリドール 10重量部

エタノール

香料組成物1

水

ポリオキシエチレン(60)硬化ひまし油

ヘディオン 10重量部  
マイヨール 10重量部  
リリアール 5重量部  
ヘリオナール 5重量部  
フェニルエチルアルコール 10重量部  
 $\alpha$ -ヘキシルシンナミックアルデヒド 10重量部  
エタノール 40重量部

【0012】＜実施例3＞以下に示す処方に従って、オーデコロンを作製した。即ち、処方成分を良く混合し、5℃で1ヶ月熟成し、濾過してオーデコロンを得た。このものを使用することにより、寝不足モデルに於いて、S/OH102を認めた。

40 重量部

10 重量部

49.9重量部

0.1重量部

【0013】＜実施例4＞以下に示す処方に従って、油中水クリームを作成した。即ち、イ、ロの成分をそれぞれ80℃に加熱し、イにロを徐々に加え、乳化し、ホモジナイザーで粒子を均一化した後、攪拌冷却してクリーム1を得た。ここでローズマリーのエッセンスとしては100gのローズマリーの地上部に11の1、3-ブタンジオールを加え、抽出を行い、濾過したものをを用い、ツボクサのエッセンスとしては100gのツボクサの全

イ

蔗糖脂肪酸エステル

ワセリン

ラノリン

流動パラフィン

低粘度シリコーン

ステアリアルアルコール

ステアリン酸

草に11の1、3-ブタンジオールを加え、抽出を行い、濾過したものをを用い、ブクリョウのエッセンスはブクリョウの菌糸の部分100gにエタノール11を加えて抽出し、濾過した後、溶媒を留去したものをを用いた。このものの評価結果はS/OHで121であった。本発明の香料組成物はブクリョウの抽出物と共存下使用することが好ましいことがわかる。

0.5 重量部

1 重量部

3 重量部

8 重量部

30 重量部

0.5 重量部

0.55重量部

ウンデシレン酸モノグリセリド	2	重量部
有機変性ベントナイト	2	重量部
香料組成物	1	重量部
口		
1, 3-ブタンジオール	5	重量部
グリセリン	20	重量部
ローズマリーのエッセンス	1	重量部
ツボクサのエッセンス	0.5	重量部
ブクリョウのエッセンス	0.1	重量部
水酸化カリウム	0.05	重量部
水	24.8	重量部

【0014】＜実施例5＞下記に示す処方に従って、ルームフレグランスを作製した。即ち、処方成分を90℃に加熱し、攪拌して均一にし、金皿に詰めて冷却して、

ルームフレグランスを得た。このものはストレスをいやす作用のあるルームフレグランスであった。

香料組成物1	10	重量部
ポリエチレン	20	重量部
マイクロクリスタリンワックス	20	重量部
ジメチコン	30	重量部
スクワラン	20	重量部

【0015】

【発明の効果】本発明によれば、誰もが簡単にできるス

トレスの緩和手段、取り分け睡眠不足のストレス緩和手段を提供することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

A61K 7/46

識別記号

315

345

F I

A61K 7/46

ターマコード (参考)

A

315A

315Z

345Z

(72) 発明者 奥田 剛弘

神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地1  
ポーラ横浜研究所内

(72) 発明者 石戸谷 豊昌

神奈川県横浜市神奈川区高島台27番地1  
ポーラ横浜研究所内

Fターム (参考) 4H059 BA12 BA14 BA20 BA35 BB05  
BB06 BB13 BB14 BB15 BB18  
BB23 BB44 BB45 DA09 EA33

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭61-267526

⑬ Int. Cl.<sup>4</sup>

A 61 K 35/78  
7/26  
7/46

識別記号

AAA

庁内整理番号

7138-4C  
7133-4C  
7306-4C※

⑭ 公開 昭和61年(1986)11月27日

審査請求 有 発明の数 6 (全32頁)

⑮ 発明の名称 ストレスを与える条件下におかれた人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる方法

⑯ 特 願 昭60-253896

⑰ 出 願 昭60(1985)11月14日

優先権主張 ⑱ 1984年11月14日 ⑲ 米国(US) ⑳ 671608

㉑ 発 明 者 クレイグ ビイ. ウォレン アメリカ合衆国、ニュージャージー、ラムソン、ドッグウッド レーン 3番地

㉒ 出 願 人 インターナショナル フレイバース アンド フレグランス イ  
ンコーポレイテッド アメリカ合衆国、ニューヨーク、ニューヨーク、ウエスト  
フイフティーセブンス ストリート 521番地

㉓ 代 理 人 弁理士 三宅 正夫 外1名  
最終頁に続く

#### 明 細 書

1. 発明の名称 ストレスを与える条件下におかれた人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる方法

#### 2. 特許請求の範囲

(1) ナツメッグ油、メイスエキス、ネロリ油、及び吉草油の内から選ばれたストレスに対する反応性を減少する物質を有効量、経皮又は吸入によって与えることを特徴とするストレスを与えられた人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる方法。

(2) ストレスに対する反応性を減少させる物質がナツメッグ油であり、投与量が約13マイクログラムから1,000マイクログラムである特許請求範囲第1項記載の方法。

(3) (a) ナツメッグ油、メイスエキス、ネロリ油、及び吉草油の内から選ばれたストレスに対する反応性を減少させる物質及び(b) 上記のストレスに對

する反応性を減少させる物質と混合可能な担体としての調香料からなり、ストレスに対する反応性を減少させる物質と担体としての調香料との重量比が、約1:100から約100:1である組成物質を有効量、経皮又は吸入によって与える特許請求範囲第1項記載の方法。

(4) ストレスに対する反応性を減少させる物質がナツメッグ油であり、投与量が約13マイクログラムから1,000マイクログラムである特許請求範囲第3項記載の方法。

(5) (a) ナツメッグ油、メイスエキス、ネロリ油、及び吉草油の内から選ばれたストレスに対する反応性を減少させる物質及び(b) エチルアルコールからなり、ストレスに対する反応性を減少させる物質とエチルアルコールとの重量比が約1:99から約99:1である組成物質を有効量、経皮又は吸入によって与える特許請求範囲第1項記載の方法。

(6) ストレスに対する反応性を減少させる物質がナツメッグ油であり、投与量が約13マイクロ

## 特開昭61-267526 (2)

ラムから1,000マイクログラムである特許請求範囲第5項記載の方法。

(7) (a) ナツメグ油、メイスエクス、ネロリ油、及び吉草油の内から選ばれたストレスに対する反応性を減少させる物質及び(b) 上記のストレスに対する反応性を減少させる物質と混合可能な担体としての調香料、及び(c) エチルアルコールからなり、ストレスに対する反応性を減少させる物質と担体としての調香料との重量比が、約1:100から約100:1であり、又ストレスに対する反応性を減少させる物質とエチルアルコールとの重量比が、約1:99から約99:1である組成物質を有効量、経皮又は吸入によって与える特許請求範囲第1項記載の方法。

(8) ストレスに対する反応性を減少させる物質がナツメグ油であり、投与量が約13マイクログラムから1,000マイクログラムである特許請求範囲第7項記載の方法。

(9) ミリスチシン、エレミシン、及びイソエレミシンの内から選ばれたストレスに対する反応性を

減少する物質を有効量、経皮又は吸入によって与えることを特徴とするストレスを与えられた人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる方法。

(10) ストレスに対する反応性を減少させる物質がミリスチシンであり、投与量が約0.013マイクログラムから50マイクログラムである特許請求範囲第9項記載の方法。

(11) (a) ミリスチシン、エレミシン、及びイソエレミシンの内から選ばれたストレスに対する反応性を減少させる物質、及び(b) 上記のストレスに対する反応性を減少させる物質と混合可能な、担体としての調香料とからなり、ストレスに対する反応性を減少させる物質と、担体としての調香料との重量比が、約1:100から約100:1である組成物質を有効量、経皮又は吸入によって与える特許請求範囲第9項記載の方法。

(12) ストレスに対する反応性を減少させる物質がミリスチシンであり、投与量が約0.013マイクログラムから約50マイクログラムである特許

請求範囲第11項記載の方法。

(13) (a) ミリスチシン、エレミシン、及びイソエレミシンの内から選ばれたストレスに対する反応性を減少させる物質、及び(b) エチルアルコールからなり、ストレスに対する反応性を減少させる物質とエチルアルコールとの重量比が約1:99から約99:1である組成物質を有効量、経皮又は吸入によって与える特許請求の範囲第9項記載の方法。

(14) ストレスに対する反応性を減少させる物質がミリスチシンであり、投与量が約0.013マイクログラムから約50マイクログラムである特許請求範囲第13項記載の方法。

(15) ストレスに対する生理的及び又は主観的反応性を示す人間を、

- 1). その人間の基礎血圧及びムードを測定し、
- 2). その人間にストレスを与え、
- 3). 同時に上記のストレスを与えることにより生ずる、その人間の血圧及びムードの変化を測定し、
- 4). その人間に、ストレスに対する生理的及び、

又は主観的反応性を減少するのに有効であるかをテストする物質を与え、

5). その物質を与えることにより生ずる、その人間の血圧の降下及びムードを測定する特許請求範囲第9項記載の方法。

(16) ストレスに対する反応性を減少する物質としてテストに用いられるものとして、ナツメグ油、メイスエクス、ネロリ油、吉草油、ミリスチシン、エレミシン及びイソエレミシンの内から選ばれた物質を用いる特許請求範囲第15項記載の方法。

(17) ストレスに対する反応性を減少する物質として、ナツメグ油、メイスエクス、ネロリ油、及び吉草油の内から選ばれたものと、そのストレスに対する反応性を減少する物質と混合可能な付香製品との混合組成物を有効量、経皮又は吸入によって与えることを特徴とするストレスを与えられた人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる方法。

(18) ストレスに対する反応性を減少させる物質



## 特開昭61-267526 (3)

が、ナツメッグ油であり、担体としての付香製品中にナツメッグ油が、13マイクログラムから1,000マイクログラムの量で対象とする人間に与えることの出来る量を含む特許請求範囲第17項記載の方法。

(19) ストレスに対する反応性を減少させる物質として、ミリスチシン、エレミシン、イソエレミシンの内から選ばれたものと~~とも~~、そのストレスに対する反応性を減少させる物質と混合可能な付香製品との混合組成物を有効量、経皮又は吸入によって与えることを特徴とする、ストレスを与えるられた人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる方法。

(20) ストレスに対する反応性を減少させる物質がミリスチシンであり、担体としての付香製品中にミリスチシンが、0.013マイクログラムから50マイクログラムの量で、対象とする人間に与えることの出来る量を含む特許請求範囲第19項記載の方法。

(21) 有効成分としてミリスチシン、エレミシン

及びイソエレミシンの内から選ばれたストレスに対する反応性を減少する物質の有効量と、~~薬学的~~<sup>人間的</sup>に許容できる物質とを含むことを特徴とするストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる医薬。

(22) 医薬は経皮<sup>人間的</sup>に、又は吸入によって与える特許請求範囲第21項記載の医薬。

(23) ナツメッグ油、メイスエキス、ネロリ油、吉草油、ミリスチシン、エレミシン及びイソエレミシンの内から選ばれたストレスに対する反応性を減少する物質を1種または1種以上を含むことを特徴とする歯みがき用組成物。

## 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、人間の生理的及び、又は主観的なストレスに対する反応性を減少するのに有効な、ナツメッグ油、メイスエキス、ネロリ油、吉草油、ミリスチシン、エレミシン、及びイソエレミシンの内より選ばれた一つ、又はそれ以上の混合物（以下において“活性物質”とも称する）を、皮膚吸入、又は吸入により、ストレスを与える条件下におかれた人間に与える事により、その人間の生理的及び、又は主観的なストレスに対する反応性を減少させる方法に関するものである。

発明の解決しようとする問題点

上に述べた“活性物質”は、そのものとして、又はアルコール或いは香料などを含む組成物の一部として、与えることが出来る。また付香製品に“活性物質”を加えることにより使用することも出来る。その様な付香製品としては、固体又は液体の陰イオン性、陽イオン性、非イオン性、或いは両性イオン性の洗剤、繊維製品柔軟剤、繊維製

品柔軟用製品、化粧パウダー、整髪製品、デオドラントステック、室内芳香剤、及び付香高分子製品などが例としてあげられる。

本発明のより好ましい方法は、吸入による投与であり、その為には閉じられた環境、例えば部屋に“活性物質”を入れ、中に居る人間に嗅げる様にすればよい。その為には例えば、室内芳香剤に“活性物質”を加えることにより目的を達することが出来る。さらに詳しくは、後で述べられる様に、本発明のストレスに対する反応性を減少させる“活性物質”を、空气中に1リットルにつき約1-125マイクログラム存在させることにより本発明を実施することが出来る。

本発明を実施することにより、生理的及び、又は主観的な反応性を減少させ得ることは、ストレスを与える条件下で、客観的にはその人間の血圧の減少をもって、又主観的には自己レポートにおいて、鎮静度、及び幸福感等に有意な向上がみられ、又当惑度及び怒りの度合等に有意な減少がみられることによって示される。

## 特開昭61-267526 (4)

本発明によるストレスに対する反応性の減少を生ずる物質の効果を確かめる方法は新規である。この方法は、心理的変化の測定と、生理的変化の測定、及びストレスを与える方法とを組み合わせ、ストレスに対する反応性を減少させると思われる物質の、ストレスに対する生理的及び、又は主観的反應に対する効果を、その物質のみについて、又はエチルアルコール、調味料、或いは付香製品、コロン等に加えて用い、測定することの出来る初めての方法である。

“ストレス”とは個々の人生において、その人の平衡状態を乱すある特定の生理的及び、又は主観的影響を与える事件、又は経験を示している。

(Glock, C.Y. & Leonard, H.L., Journal of Chronic Diseases, 179, 5, 1956)。ストレスの原因としては、個人の職業、例えば頻繁な空港のコントロールタワーでの従事、又は転職、家族の死、離婚などの人生における変化、或いは日常の煩雑さからくる小さないらいらとか緊張等があげられる。

“反応性”とは、個人の生理的及び、又は主観的状態がストレスによって変化をきたされることを言う。本発明においては、“反応性”は平衡状態での血圧に対して、ストレスを与えた時に生じた血圧の変化を測定することにより、客観的に確かめる事が出来る。又ここで“生理的変化”とは、この様な反応性を示すのに用いられている。

経口、又は皮下注射などで与えられる医薬とは異なり、本発明の実施に用いられる物質は吸入及び、又は経皮により与えられる。従って本発明を実施するに当り、“投与量”とは以下において、ストレスに対する反応性を減少する物質が吸入され、残った量より血液中に吸収された量、又は皮膚より吸収され血液中に吸収された量を計算したものを意味する目的で使われている。

本発明の目的においては、統計的に有意なストレスにより生じた収縮期血圧 ( $p < 0.1$ ) の変化は、一般に 3 mmHg 以上である。

以下に述べる主観的反應性とは、個人の自己レポートにおいて次に記す感情について、統計的に

有意な変化 ( $p < 0.05$ ) を示す場合をいう。

リラックス度の減少

幸福感の減少

鎮静度の減少

心配度の増加

緊張感の増加

当惑度の増加

怒りの度合の増加、及び又は

不安度の増加

ストレスに対する反応性は個人個人で異なる。

或る人が打ち勝てる様なストレスでも、他の人を病気にすることもある (Executive Fitness Newsletter, Rodale Press Inc., Vol. 15, No 17, 1984)。“反応性”とは以下ではストレスに対するマイナスの反応を意味している。

ストレスに対する“反応性”は、医薬による治療を要する様な平常時での異常に高い血圧とか、精神の不安定等と混同してはならない。例えば、数週間繰り返し血圧を測定し、常に収縮期血圧が 140 mmHg; 弛緩期血圧が 90 mmHg 以上であると

定義されている高血圧症と混同してはならない (高血圧の発見、診断、治療に関する国家共同委員会のレポート、Journal of the American Medical Association, 277, 255-261, 1977)。

反応性、高血圧、精神不安定は共に関連があることは確かである。異常な精神不安定、又は抑圧感、その主たる原因となる理由として、無力感、半信半疑、予期、目的のない興奮、或いはそれらと同様な条件が、主なものとしてあげられる

(Zucker, M. & Spielberger, C.D., Emotions and Anxiety, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey, 1976、又、The Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association, DSM 3 1980 を参照)。

本発明をさらに詳しく述べると、

1). 近代の医薬及びアロマセラピーの殆んどは、主に病気の治療を目的としている。本発明の実施は、医者も必要としない様なストレスによって生

## 特開昭61-267526 (5)

ずる人の生理的及び、又は主観的な反応性を軽減させることにある。普通、通常のストレスに対する反応性は、収縮期血圧の断続的な上昇として測定可能ではあるが、外面的には明らかに観測出来る様な反応を伴わない。

本発明に用いられる物質は、生理的効果があることは知られていたが、それらは民間医薬或いはアロマテラピーにおいて、この発明の使用法とは異なる目的で使用されていた。例えば、(Valnet)はナツメグ油を鎮痛剤(外用薬)として、又ネロリ油を外用薬としてではなく内服することを記している(Valnet, J. "The Practice of Aromatherapy", Destiny Books, Division of Inner Traditions International, Ltd., New York, N.Y. 1983)。又(Tisserand)はネロリ油を使うと、ぜいたくなりリラックスするデオドラントのバスオイルが出来るとしている。これはネロリ油が最も有効な鎮静作用のある抗うつ性の油であり、不眠症、ヒステリー、精神不安定、抑うつ症に有効であるという記述と一致している(Tisserand, R.

"The Art of Aromatherapy", Destiny Books, Division of Inner Traditions International, Ltd., New York, N.Y. 1983)。

アロマテラピー、及び民間医薬の文献には、上に述べた様に、投与はグラム量を経口投与したり、グラム量を身体にマッサージ等をして行なう事が記してある。しかしながら本発明に述べられている様に、植物から得られた物質、又はそれらを合成したものがマイクログラムの単位で吸入、又は経皮により、ストレスに対する生理的及び、又は主観的反應性を減少するという事は、どの文献にも記されていない。

2). 本発明の実施により得られる効果は、ストレスにより生ずる血圧の上昇を減少させることを含み、メディテーション(黙想法)やバイオフィードバック(生理自己制御法)等によって得られる結果と同じ様なものである。しかしながらメディテーションやバイオフィードバックの様にトレーニング等は必要とせず、本発明におけるストレスに対する反応性を減少させる物質を使用するこ

とが出来。本発明によるストレスに対する反応性を減少させる物質の効果は、その物質を吸入することにより、4分間以内に得ることが出来る。

3). 精神安定剤等とは異なり、本発明に用いる物質の揮発性成分(例えば、ナツメグ油、メイスエクス、ネロリ油、香草油、ミリスチシン、エレミシン、及び、又はイソエレミシン等)の効果は、本質的には予防的なものであり、ストレスが与えられる条件が存在する時、ストレスに対する生理的及び、又は主観的反應性を減少するものである。ストレスの無い人間に対しては、本発明の方法による効果は得られない。

従ってバスオイル成分に活性物質を加える事は、この発明の実施とはならない。何故なら、入浴することは普通ストレスの与えられる様な状態が起こった後で行なわれるからである。しかしながら上に述べた(Tisserand)のネロリ油を含むバスオイルによるリラックス効果は、長い間ストレスに対する反応性が下らない人に対する効果かも知れない。

4). 本発明の実施は、調香料等に例えばナツメグからの精油を加えたりする従来の技術とは区別される。近代における香料の使用は、ストレスの無い状態での使用であり、その上、ストレスに対する反応性を減少させる効果のある濃度以下にしか活性物質を空气中に存在させない。

#### 問題点を解決するための手段


本発明は、必然的に、人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反應性を以下に述べる方法によりテストし、検知する方法にも関する。即ちそのテスト法とは、

- 1). 被検者の初期血圧、及びムードの測定。
- 2). 被検者にストレッサー(ストレスを与える様な質問又は作業等)を用いてストレスを与える。
- 3). 同時に被検者にストレスを与えたことによる血圧の変化、及びムードの変化を測定する。
- 4). 被検者に、ストレスに対する反応性を減少させると考えられる物質を与える。
- 5). 被検者に、ストレッサーを与え、同時にストレスに対する反応性を減少させると考えられる

物質を与えたことによる血圧の変化、及びムードの変化を測定する。


の順序により行なわれる。

前にも述べた様に、本発明はナツメグ油、メイスエクス、ネロリ油、吉草油、構造式、



(11)

を持つミリスチシン、構造式、



(12)


メイスエクスがこの発明で用いられるが、さらに純度の高くしたものでもよい。同様、市販の吉草油がこの発明に用いられるが、二度蒸留された様な、さらに純度の高いものでも用いることが出来る。

さらに、天然に存在する、或いは合成によって作られたミリスチシン、エレミシン、及びイソエレミシンを本発明に用いることが出来る。

従って、構造式1を持つミリスチシンは、東インドナツメグ油、西インドナツメグ油、又はフィジナツメグ油より蒸留により分離することも出来るが、又次の反応によって合成することも出来る。

# 特開昭61-267526 (6)

を持つエレミシン、構造式、




(13)

を持つイソエレミシンの内から選ばれた一つ、又は、二種以上の混合物を、単一か或いは他の物質、例えば付香製品、コロソ及び、又はエチルアルコール等と混合したものを有効量与えることにより、ストレスを与える条件下におかれた人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる方法が主目的である。

ナツメグ油、メイスエクス、ネロリ油、及び吉草油については、種々の品種の物が本発明の実施において有用である。従って、例えば東インドナツメグ油、及び西インドナツメグ油は、共に本発明に用いることが出来る。標準商業品種の


(12784)

## 特開昭61-267526 (7)




イスの香りを与える。

しかしながら、ここで用いられる“担体香料”、及び“担体調香料”という言葉は、“活性物質”以外の有機化合物の混合物で、非活性物質という意味で用いられている。それらの例としては、芳香アルコール類、例えば構造式、



を持つ様な芳香アルデヒド類、ケトン類、ニトリル類、例えば構造式、




或いは構造、

ートからなっている。

調香料は、それぞれの成分が調香料の特徴ある香りに寄与しているが、全体としての調香料の効果は、個々の成分の効果を合計したものである。従って個々の香料化合物又はそれらの混合物は、目的とする調香料の芳香を変化させるのに用いる事ができる。例えば、調香料中の他の成分の香りを強く出したり、又和らげたりすることが出来る。この発明の“活性物質”は、ストレスを与える条件におかれた人間のストレスに対する反応性を減少させると共に、担体としての調香料の芳香の性質をも変える。従って、担体としての調香料の処方による芳香よりも、全体として担体調香料をベースとして、好ましい芳香を得る様に処方を作らなければならない。

“活性物質”を含む調香料、コロンは、吸入によって与えられるが、また皮膚に付けて使用される場合には、皮膚からの吸収によって与えられる事をみとめなければならない。室内芳香剤の場合には、ほぼ全体が吸入によって与えられる。

# 特開昭61-267526 (8)



を持つ環状エーテル等のエーテル類（但し、エレミシン、イソエレミシン、及びミリスチシンは除く）、ラクトン類、炭化水素、合成及び天然精油（但し、ナツメグ油、ネロリ油、メイスエクス、及び吉草油は除く）、等が掲げられ、これらの混合しよい香りのする香料として使用される。

本発明の実施において、最新の技術による調香料、コロンを担体として用いられるが、“活性物質”も香料であるので、次に記することを考慮に入れなければならない。

調香料は普通、(a)主調になるノート、“ブケー”或いは基礎ノート、(b)主調ノートを和らげ、共に生かされる修飾ノート、(c)その調香料に、一定の香りを与え、揮発度を下げるフィクサティブ、及び(d)通常低沸点で、新鮮な香りのするトップノ

ストレスに対する反応性を減少する調香料の使用量に対する有効量は、多くの要因によって異なる。その様な要因としては、使用者の皮膚の状態、使用中の湿度、温度、気圧等の環境条件、使用時の使用者の精神状態、使用者の体重、血圧等の身体の状態等があげられる。即ちこれらの全ては、使用者個人の反応性、及び安楽と感ずる度合が、その使用者に対する有効量を決めるという事である。

調香料は、そのまま(100%)、又はコロンのとして使用することが出来る。“活性物質”の有効量を確實にする為には、使用量、使用回数、例えば夏用と冬用とかいった処方の種類等も考慮に入れなければならない。本発明においては、コロンのとは、アルコール、又は水性アルコールに入れられた調香料をさす。コロンの調香料が1~99%で、残りがアルコール、又は水性のアルコールである。水とアルコールの比は、50:50から0:100の間である。普通用いられるアルコールの例としては、SDA-39-C、SDA-

## 特開昭61-267526 (9)

40、或いは190度又は無水アルコール等である("Ethyl Alcohol Handbook" 5 Th Edition, National Distillers and Chemical Co.参照)。コロソ製品には、溶解化剤、柔軟化剤、ヒューメクタンと、湿化剤、静菌剤、その他の化粧品に用いられる材料等を加えてもよい。

通常、調香料及びコロソは、"活性物質"を吸入又は噴ぐことにより、身体に取り入れられるが、又皮膚に付けることにより、皮膚吸収により取り入れられる。

又、ストレスに対する反応性を減少させる物質と合う調香料を用いて、担体としての製品に付香することも出来る。その様な付香製品としては、

繊維柔軟剤、BOUNCE<sup>®</sup> (Procter & Gamble Co. Cincinnati, Ohio の商標) の様なドライヤー用繊維柔軟剤製品、化粧パウダー、タルク、固体又は液体性の陽イオン性、陽イオン性、非イオン性、或いは両イオン性の洗剤、付香高分子、デオドラントステック、整髪製品、石鹸等が例としてあげ

られる。さらにこの発明でのストレスに対する反応性を減少させる物質と合う香料材料を用いて室内芳香剤として用いる事が出来る。従って多くの最新の技術による調香料や付香製品が、"活性物質"を加える事により、本発明を実施する為に用いることが可能である。この様に、ストレスに対する反応性を減少させる物質を、単独又は担体としての調香料或いは付香製品と共に用いる事が出来る。多くの市販の製品が担体材料と成り得る。これらの付香製品に加えられる量としては、調香料とストレスに対する反応性を減少させる"活性物質"とを合わせて、0.1重量パーセントの低い濃度でもよい。一方、室内芳香剤の場合には、調香料とストレスに対する反応性を減少させる"活性物質"とを合わせて、9.9重量パーセントの高い濃度でもよい。この様に、付香製品には、非活性の調香料と、ストレスに対する反応性を減少させる"活性物質"とを混合したものを、0.1~9.9重量パーセント加えることが出来る。

本発明の実施として、ストレスに対する反応性

を減少させる"活性物質"を、デオドラントステック又はデオドラント石鹸に加えた場合には、二重の効果が起る事は注目される。

(1) デオドラントステックそのものが、人間の腋下のデオドラントとして働くのと同時に、

(2) ストレスに対する反応性を減少させる"活性物質"が、吸入又は皮膚吸収され、ストレスを与える条件におかれた人間のストレスに対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させる。

付香製品としては、ストレスに対する反応性を減少させる"活性物質"を含む調香料を加えたポリエチレン、ポリプロピレン、又は他のポリマーからなる固体ポリマー製品をも含む。それらの付香ポリマー製品は、既知の方法で作ることができる。明細書に記載した活性物質はまた歯みがき用組成物として投与することができる。

更に、ナツメグ油、ネロリ油、メイスエキス、吉草油、ミリスチシン、エレミシン、及びイソエレミシン等の、本発明のストレスに対する反応性を減少させる物質は、単独又は混合物として、多

孔質のポリマー構造内に吸収することも出来る。又合成ポリマー以外の担体を用いて、付香製品を作ることも出来る。その様な担体としては、例えば、グアーガム、キサンチンガム、ガムアラビックなどのガム類、ゼラチン、尿素ホルムアルデヒドの共重合物の様なマイクロカプセル化の出来る担体等があげられる。これらの中に、ストレスに対する反応性を減少させる"活性物質"を、単独又はアルコールや調香料との混合物として入れることが出来る。

上に述べた様に、精神安定剤とは異なり、"活性物質"の効果は、ストレスの生ずる条件下におかれた人間の、ストレスに対する生理的及び、又は主観的に反応性を減少するものであり、ストレスの生じる条件下に置かれていない人間については、この発明における"活性物質"を与えても効果は出ない。

ストレスに対する反応性を減少させる"活性物質"の、担体としての調香料、コロソ、或いは付香製品に対する重量比は、約1:100から100

## 特開昭61-267526 (10)

: 1 が好ましい。ここで担体としての調香料、コロン、或いは付香製品に使う香料材料には、ストレスに対する反応性を減少させる物質、又は医療用精神安定剤として用いられる例えばベンゾジアゼピン誘導体や、高血圧症に用いられるメチルドーパやプロピラノロール等の様な物質を含まない事が重要である。

本発明において、「活性物質」とエチルアルコールを共に用いることは、特に重要である。エチルアルコールは、「活性物質」の効果を強化しているかも知れないからである。既に述べた様に、エチルアルコールは、標準コロンの成分である。

ストレスに対する反応性を減少させる「活性物質」とエチルアルコールを共に用いた場合、「活性物質」のエチルアルコール（含有アルコール量）に対しての重量比は、約1:99から99:1が好ましい。本発明で用いるエチルアルコールは、50%の水性アルコールから100%の無水アルコールを含む。

本発明の有利な点は、人間のストレスに対する

生理的及び又は主観的反応性を減少させる「活性物質」の投与量が、マイクログラムの単位で非常に少ない事である。

さらに詳しく投与量について述べると、先ず「活性物質」は、2つのグループに分けられる。

グループ「ALEPH」	ナツメグ油
	メイスエクス
	ネロリ油
	吉草油
グループ「BETH」	ミリスチシン
	エレミシン
	イソエレミシン

但し、両グループの物質は、単独又は混合物として使用し得る。

本発明の目的とするグループ「ALEPH」の投与量は、13マイクログラムから1.000マイクログラムであり、グループ「BETH」の投与量は、0.013マイクログラムから50マイクログラムである。グループ「ALEPH」と「BETH」が一様に

使用される場合、投与量は約0.013マイクログラムから1.000マイクログラムであり、但しグループ「BETH」の「活性物質」は混合物中、約50マイクログラム以下とする。

ここで言う投与量とは、呼吸により吸入され、残存し、血液中に吸収された量、又は経皮により血液中に吸収された量を意味する。上に述べたレベルの計算するに当たっての推定は、表1及び表2とその説明文に示してある。

担体としての調香料（「活性物質」を含まない）と「活性物質」グループ「ALEPH」との上限の重量比、即ち100:1で「活性物質」を使用する場合には、「活性物質」が約13から1.000マイクログラム必要であるので、担体としての調香料は、約1.300マイクログラム（1.3mg）から約100.000マイクログラム（0.1g）が必要となる。さらに担体としての調香料（「活性物質」を含まない）と「活性物質」グループ「BETH」との上限の重量比、即ち100:1で「活性物質」を使用する場合には、「活性物質」が約0.013

から約50マイクログラム必要であるので、担体としての調香料は、約1.3マイクログラムから約5.000マイクログラム（5mg）を必要とすることになる。

同様に、担体としての調香料（「活性物質」を含まない）と「活性物質」グループ「ALEPH」との下限の重量比、即ち1:100で「活性物質」を使用する場合には、「活性物質」が約13から1.000マイクログラム必要であるので、担体としての調香料は、約0.13マイクログラムから10マイクログラムが必要となる。さらに担体としての調香料（「活性物質」を含まない）と「活性物質」グループ「BETH」との下限の重量比、即ち1:100で「活性物質」を使用する場合には、「活性物質」が約0.013から約50マイクログラム必要であるので、担体としての調香料は、約0.00013マイクログラムから約0.50マイクログラムを必要とすることになる。

従ってこの発明において使用される調香料と「活性物質」との混合物の量は、



## 特開昭61-267526 (11)

a). グループ "ALEPH" の "活性物質" では  
13 マイクログラムから100,000 マイ  
クログラム (0.1 グラム) で、

b). グループ "BETH" の "活性物質" では  
0.013 マイクログラムから5,000 マイ  
クログラム (5 ミリグラム) の範囲になる。

既に述べた様に、本発明に基づく付香製品は、  
非活性物質である担体香料と "活性物質" とを合  
わせて約0.1重量%から99重量%含むことが出  
来る。従って本発明に基づいて付香製品の重さが  
100グラムの物を作れば、約0.1から99グラ  
ムの "活性物質" を含む香料を用いることが出来  
る。しかしながら本発明の実施に当っては、この  
範囲のみに制限されない。

本発明の実施に当って、付香製品により実際の  
な制限があることは認められる。例えば、"活性  
物質" を衣服に着香することにより与え機とした  
場合、付香した洗剤でもって衣服に着香しようと  
するのは困難かも知れないが、付香した繊維柔軟  
剤で行えばより可能である。付香デオドラント製  
品、化粧パウダー、ハンドソープの様な製品を用  
いる場合は、処方技術の工夫により可能であり、  
室内芳香剤の様に非常に簡単な場合もある。

又、"ALEPH" グループの "活性物質" の  
13-1000 マイクログラム、及び "BETH"  
グループの "活性物質" の0.013-50マイ  
クログラムという投与量の範囲についても不確定性  
があることは認められる。発明の為の実験は、必  
要上人為的な条件で行わなければならないので、  
結果は必ずしも正確に発明の広範な実施における  
場合の投与量に、当てはまらない事も考えられる。  
本発明の理解を助ける意味で、又実施例から実際  
の広範な本発明の実施を理解する助けとなる意味  
で、実験の条件、本発明者らによる投与量の概算

を以下に記す。

上に述べた "ALEPH" グループと "BETH"  
グループの有効投与量レベルは、実施例2に記さ  
れる調香用ブロッカー、又は実施例3及び4で記  
されるウィック (心材) と小瓶の様な組合わせの  
装置から、被験者が吸入して効果的に取り入れる  
量を推定したものである。

ストレスに対する反応性を減少させる成分は、被  
験者の鼻の先約0.5インチの位置におかされる。  
投与量の推定には、次の仮定をしている。

1. 平均的被験者の休んでいる状態での呼吸速度  
は、1分間に10リットルとする。
  2. 揮発成分の25%が、吸入され残存するとす  
る。ここでは、香料から揮発する物質の50%  
が吸入により取り入れられ、その内50%が排  
出されると仮定している。
  3. 効果的に体内に取り込まれる量は、吸入され  
残存した量の約10%とする。
  4. 平均体重を65キログラムとする。
- この投与量の推定は、マリファナ煙草の吸入に

よる  $\Delta^9$ -テトラヒドロカンナビノール ( $\Delta^9$ -  
THC) の血漿中におけるレベルの計算を基にし  
ている。この場合、 $\Delta^9$ -THCの吸入された内  
約50%が残り、その内約10%が血漿中に検出  
されている (Nahas, G. and Paton, D., eds., "Mar-  
ibuan: Biological Effects," in Advances in  
the Biosciences, Vols 22/23, Pergamon Press,  
N. Y., page 289, 1979)。上の推定に加えて、  
次に述べる点も考慮に入れている。

1. ストレに対する反応性を減少させると考えら  
れる成分の含まれている香料から蒸発する物質  
の量は、重量の減少量でもって得られた。
2. グループ "BETH" 中の成分、即ちミリス  
チシン、エレミシン、イソエレミシンのヘッ  
スペース中の濃度は、ガスクロマトグラフィー  
を用いて測定した。
3. 被験者が、ストレスに対する反応性を減少さ  
せる物質を吸入した時間は、20分間であった。  
次に示す表1及び表2は、結果をまとめたもの  
である。

特開昭61-267526 (12)

表1. ストレスに対する反応性を減少する物質と非活性香料を含む物質の蒸発速度

実施例	蒸発速度 ( $\mu\text{g}/\text{min}$ )		蒸発物質 の %	グループ"ALEPH"の 蒸発速度の計算値 ( $\mu\text{g}/\text{min}$ ) (a)	グループ"ALEPH" 中 のグループ"BEH"の 蒸発速度の計算値 ( $\mu\text{g}/\text{min}$ ) (b)
	活性物質と非活性 香料よりなる油	エチル アルコール			
2	0.12	0.18	40	0.05	0.05
3 (A)	0.26	0.26	100	0.26	0.26
3 (B)	0.15	—	40	0.06	0.06
フレイグランスB	0.26	0.26	2	0.005	0.005

注: a) グループ"ALEPH"の蒸発速度の計算値は、活性物質と非活性香料よりなる油の蒸発速度と油中の活性物質のパーセントを掛け合わせたもの。

b) グループ"ALEPH"中のグループ"BEH"の量は、ガスクロマトグラフィーにより (実施例1を参照) 約0.1%である。

表2. 吸入され、貯存し、血液中に吸収される量

実施例	吸入され、貯存する量 ( $\mu\text{g}/\text{min}$ )	血液中に吸収されるグループ "ALEPH"の測定値 ( $\mu\text{g}/\text{min}$ )	血液中に吸収されるグループ "ALEPH"中のグループ "BEH"の測定値 ( $\mu\text{g}/\text{min}$ )
2	1.3	1.3	0.0013
3 (A)	6.5	6.5	0.0065
3 (B)	1.5	1.5	0.0015
フレイグランスB	1.3	0.13	0.00013

## 示唆される成分のレベル

1. 空気中の濃度: 吸入量/呼吸速度を推定 (これは、"ALEPH"又は"BEH"の蒸発速度を吸入されない部分を計算に入れるか、2で割り、さらに1分間に10リットルの呼吸速度で割ることにより求められる)。

(12/25)

表 3.

実施例	空気中におけるストレスに対する反応性を減少する物質の量 ( $\mu\text{g}/\text{L}$ )	
	グループ"ALEPH"成分	グループ"ALEPH"成分中 グループ"BEH"成分
2	2.50	0.00250
3 (A)	13.00	0.01300
3 (B)	3.00	0.00300
フレイグランスB*	0.25	0.00025

注: \* フレイグランスBは、ナツメグ油を含む既知の調香料である。この調香料は、本発明者の知る限り、"活性物質"を最も含んでいるので用いた。"活性物質"の投与量は、この調香料を用いると、本発明の基礎投与量のさらに約10%である。

## 特開昭61-267526 (13)

2. 投与レベル：最低の投与レベルは、実施例2で10分間に効果的に吸収される量である。最低量はグループ“ALEPH”については、13マイクログラム、グループ“BETH”については0.013マイクログラムである。最低量については、鎮静用バスオイルや“活性物質”を外用として示す民間医薬の文献より推定した。ここで最大量は、麻酔作用があると報告されている量の約1%又はそれ以下としている。

以上では、“活性物質”が身体内部の生体膜を通過して取り入れられる吸入によって使用される場合のみが示されているが、“活性物質”は、身体外部の生体膜、特に皮膚組織から取り入れられることは、よく知られている（例えば、民間薬やアロマテラピーにおける“活性物質”の外用等を参照）。従って本発明の実施は、吸入及び皮膚吸収による両方の場合を含み、両方法では、同じ投与量を用いると考えられてよい。

## 実施例


以下に示す実施例1は、ストレスに対する反応

性を減少させる物質、例えばミリスチシン、エレミシン等の分析方法、製法等の例を示す。実施例2、3、4、5は、本発明のストレスに対する反応性を減少させる物質の調整、及びテスト法を示す。実施例6以下では、ストレスに対する反応性を減少させる物質を、付香製品に入れる例を示す。これらの実施例は、本発明の広範な実施を制限するものではない。

## 実施例1 (A)

## 東インドナツメグ油からミリスチシンの分離と、東インドナツメグ油のヘッドスペース分析

東インドナツメグ油を、蒸留段数1の短い蒸留塔を用いて、注意深く蒸留し、次の蒸留区分を得た。



り次の区分を得た。

蒸留区分	蒸気温度 (°C)	液体温度 (°C)	圧 (mmHg)	重量 (g)
1	43/42	47/46	20/20	26.2
2	42	47	20.0	77.6
3	43	48	20.0	73.1
4	45	52	20.0	67.0
5	45	52	20.0	84.0
6	45	54	20.0	67.6
7	47	63	20.0	58.4
8	49	76	20.0	62.5
9	63	82	5.0	38.4
10	71	100	1.2	45.0
11	94	108	1.2	14.3
12	98	111	1.2	24.6
13	100	117	1.2	26.9
14	96	130	1.1	17.9
15	100	180	1.0	10.5

蒸留区分13及び14を合わせ、さらにスピニングバンド精留器（Heater Fast Auto Annular Distillation Unit）を用いて分留することによ

蒸留区分	蒸気温度 (°C)	液体温度 (°C)	圧 (mmHg)	重量 (g)
1	68/72	156/158	0.6/0.6	1.7
2	72	161	0.60	2.9
3	74	161	0.60	3.6
4	72	158	0.60	4.2
5	70	156	0.60	3.5
6	74	157	0.65	3.2
7	71	159	0.50	4.2
8	71	160	0.55	4.9
9	71	159	0.55	3.6
10	71	161	0.55	2.5
11	71	169	0.55	2.5
12	66	185	0.55	1.7

蒸留区分7～12をまとめ合せた。

図1は、前述の蒸留により得られた、蒸留区分7～12をまとめあわせたもののガスクロマトグラフィーを示す（条件：(400°C × 0.032")  
(Carbowax, fused silica)カラム使用、プログラム

## 特開昭61-267526 (14)

-75~220℃、2℃/min)。この様にして得られたかなり純度の高いミリスチシンを、実施例2で示される実験に用いた。

## 実施例1 (B)

## ナツメグ油及びメイス油のヘッドスペース分析

2グラムの東インドナツメグ油、又はメイス油を250ccのフラスコに入れる。このフラスコにステンレス製の鉤を備えたゴム栓を付け、この鉤には、ジオクチルフタレートに浸した2cmのステンレス製鉤を付けておく。このジオクチルフタレートに、ナツメグ油のヘッドスペースにある成分を15分間吸着させる。15分後ゴム栓をフラスコからはずし、鉤に付けた鉤を取りはずす。ヘッドスペース成分を含むジオクチルフタレートは、鉤から遠心分離器で分離する。これをガスクロマトグラフィーで分析した(条件:OV-1フュージドシリカ(fused silica)カラム使用、プログラム-75~220℃、2℃/min)。

図2は、ナツメグ油のヘッドスペースのガス

クロマトグラムであり、それぞれのピークの同定は下記に示す通りである。

ピーク番号	化合物名
10	α-ツエン
11	α-ピネン
12	サビネン
13	β-ピネン
14	ミルセン
15	α-フェナンドレン
16	Δ-3-カレン
17	α-テルピネン
18	p-シメン
19	r-テルピネン
20	テルピノン
21	リナロール
22A、22B	1-ヒドロキシ-1-メチル-4-イソプロピル-2-シクロヘキサ
	サン
23	2-メチル-5-エチルフラン

24	4-テルピネオール
25	α-テルピネオール
26	1-メチル-3-ヒドロキシ-4-イソプロピルベンゼン
27	イソボルニルアセテート
28	n-アミルメトキシベンゼン
29	オイゲノール
30	α-テルピニルアセテート
31	α-クベベン
32	オイゲニルメチルエーテル
33	α-コベン
34	トランス-イソオイゲノール
35	α-ベルガモテン
36	4-プロピル-1,2-ジメトキシベンゼン
37	ミリスチシン
38	δ-カジネン
39	エレミシン
40	4-アリル-2,6-ジメトキシフェノール

表4は、ナツメグ油のヘッドスペース成分を15分後、1時間後、及び2.4時間後上に述べた方法で分析した結果をまとめたものである。

表4. ナツメグ油のヘッドスペース成分

化合物	15分後(X)	1時間後(X)	24時間後(X)
α-ツエン	2.80	2.90	2.30
α-ピネン	25.00	25.20	20.50
カンフェン	0.40	0.40	0.32
サビネン	25.20	24.40	21.00
β-ピネン	20.00	18.90	16.50
ミルセン	2.80	3.00	3.00
α-フェナンドレン	1.00	1.00	1.10
Δ-3-カレン	1.00	1.00	1.00
α-テルピネン	3.80	4.10	4.40
p-シメン	1.30	1.40	1.41
リモネン	6.60	7.30	8.00
r-テルピネン	4.50	5.10	6.80
テルピノレン	1.20	1.40	2.20
リナロール	痕跡	痕跡	0.50

## 特開昭61-267526 (15)

テルピネオール-4	1.80	2.30	6.81
α-テルピネオール痕跡		0.20	0.60
サフロール	0.20	0.30	1.40
ミリスチシン	痕跡	0.10	0.75

投与量の計算の目的の為に、ミリスチシンのヘッドスペースにおける濃度は、全ナツメグ油の揮発量の0.1%とした。

表5は、ナツメグ油及びメイスエキスの平衡蒸気中のミリスチシンを、15分後、1、2、3、4、及び24時間後、上に述べた分析方法で分析し得られたパーセントをまとめたものである。

表5. ナツメグ油及びメイスエキスのヘッドスペースの分析

蒸発時間	ナツメグ油中のミリスチシン (%)	メイスエクス中のミリスチシン (%)
15分	痕跡	痕跡
1時間	0.10	0.90
2時間	0.40	2.80
3時間	0.50	5.00
4時間	0.60	7.00
24時間	0.75	8.00

表6は、東インドナツメグ油、テルペンレスナツメグ油、2種類の市販ナツメグ油、及びメイスエキスの全成分を示したものである。

表6. ナツメグ油及びメイス油の成分


化合物	東インド ナツメグ油	テルペンレス ナツメグ油	市販 ナツメグ油 X	市販 ナツメグ油 Y	メイス エキスの ナツメグ油
α-ツエン	2.50%	1.00%	1.50%	0.60%	0.60%
α-ピネン	22.20	9.10	30.70	0.76	1.10
カンフェン	0.30	0.15	0.43	痕跡	-
サビネン	18.73	14.60	16.55	0.60	1.10
β-ピネン	15.30	11.61	12.00	1.80	2.63
ミルセン	2.50	2.70	2.00	0.50	0.74
α-フェナントレン	0.94	1.10	0.40	0.18	0.25
Δ-3-カレン	0.90	0.98	0.45	1.40	0.67
α-テルピネン	3.70	4.60	1.64	2.30	1.30
p-ジメン	1.00	1.74	1.72	-	1.50
リモネン	6.60	9.40	17.63	2.90	3.00
γ-テルピネン	5.50	8.92	2.40	2.10	2.20
トランス-サビネン/ハイドレート	0.20	0.33	0.34	1.33	1.15
α-p-ジメチルサチレン	0.07	0.12	痕跡	痕跡	0.10
テルピノレン	1.77	3.00	0.85	0.75	1.20
シス-サビネン/ハイドレート	0.15	0.30	0.20	0.80	0.80
リナロール	0.19	0.30	0.20	0.80	0.80
不明 (2異性体)	-	-	-	2.30	4.00
2-p-メチルサチレン-1-オール	0.14	0.25	0.16	痕跡	痕跡
2-p-メチルサチレン-1-オール (異性体)	0.09	0.18	0.10	1.14	痕跡
2-エチル-5-メチルフラン	痕跡	痕跡	痕跡	-	-
テルピネオール-4	6.00	10.48	3.58	6.30	3.61
α-テルピネオール	0.70	1.28	0.47	0.70	0.60
ビベリトール	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡
ビベリトール (異性体)	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡	痕跡
p-メチルサチレン-1-オール-4-イル エチルエーテル	-	-	-	0.60	1.50
サフロール	1.70	3.00	1.12	3.64	4.45

イソボルニルセテート	-	-	-	-	凝結
ボルニルセテート	凝結	0.13	-	凝結	凝結
チモール	-	-	-	-	-
アミルアニソール(T)	0.21	0.36	-	凝結	-
オイゲノール	0.21	0.96	0.10	0.80	1.00
α-テルピニルセテート	0.10	0.20	0.05	0.10	0.30
α-クベベン	0.05	0.10	凝結	0.10	凝結
パニアアン	-	-	-	凝結	-
ネリルセテート	0.10	0.17	0.08	0.10	凝結
オイゲンニルアルエーテル	0.30	0.50	0.10	1.80	1.80
α-コバエン	0.23	0.41	0.16	0.93	0.55
トランス-イソオイゲノール	0.31	0.60	凝結	0.71	3.30
α-ベルガモテン	凝結	0.12	凝結	凝結	凝結
メチルイソオイゲノール	凝結	凝結	0.35	0.26	凝結
ミスチシン	7.10	11.23	5.00	33.50	31.00
Δ-カデネン	凝結	凝結	0.07	1.85	0.10
エレミンシ	0.11	0.45	0.07	1.20	1.20
ドデカ酸	-	-	-	凝結	-
4-アリール2,6ジメキシフェノール	0.08	0.19	凝結	2.70	5.00
ミスチン酸	-	-	-	15.32	-
テトラデカン酸エチルエステル	-	-	-	5.10	2.30
オクタデカン酸メチルエステル	-	-	-	0.85	1.00
バルミチン酸エチルエステル	-	-	-	1.30	5.00
オレイン酸エチルエステル	-	-	-	-	1.50
オクタデカン酸メチルエステル	-	-	-	1.00	-
<hr/>					
	99.98	99.96	100.00	98.01	87.64

凝結=<0.01%

—252—

特開昭61-267526 (17)



単離したミリスチシンは実施例5でも用いた。  
実施例2


“活性物質”の効果の測定方法

4段階の臭いの条件について、要因分析実験法を用いてテストを行った。結果の分析は、2変量分散分析で行った。要因（ファクター）は、フレイグランス“A”と、“中性”フレイグランスで、レベルは、“活性物質”の有無である。結果の分析は、Digital Equipment Co. (DEC) の11/780 VAXコンピューターを用い、BMDP統計ソフトウェアを使って行なった。分散分析（ANOVA）技術については、R.B. McCall, Fundamental Statistics for Psychology, 2nd Ed., Harcourt Jovanovich, New York, N.Y.; pages 236-64, 1975に記載説明されている。


ここで“P”は、ANOVAの結果によって得られたF-テストより得られる有意度を示す。Pは、得られた結果が、ランダムエラーによる確率を示している。

フレイグランスの成分は次の通りである。

1. フレイグランス“A”の成分  
3環式イソクロマン構造、




を持つ GALAXOLIDE<sup>®</sup> (International Flavors & Fragrances Inc. の商標) . . . . . 47.1%  
構造




ベルドックス  
を持つ Verdox<sup>®</sup> (International Flavors & Fragrances Inc. の製造する化合物) . . . . . 21.1%  
ジエチルフタレート . . . . . 12.6%  
ピーチアルデハイド . . . . . 10.5%

ブレンリアセテート . . . . . 4.0 %  
 ヘキシルシンナミックアルデヒド . . . . . 2.6 %  
 イソアミルブチレート . . . . . 1.3 %  
 構造、



AA-トリプル  
 を持つアルデヒド(AA-TRIPLAL) (International  
 Flavors & Fragrances Inc.の製造する化合物)  
 . . . . . 0.05 %

構造、



を持つエチルマルトール又はベルトールプラス  
 (VELTOL PLUS) . . . . . 0.01 %

ていない)で行なわれた。被験者は、一人ずつテストされ、テープレコーダーにより指示される。血圧と心拍数は、自動的に記録出来るデジタル脈搏血圧記録計(武田医療器製、東京)を用いて行なった。このプロトコル(テスト方法及び順序)では、トリートメント、即ちフレイグランスを与えた場合、そうでない場合、或いはストレスに対する反応性を減少させる物質を与えた場合に、ストレス(ストレスを与える作業)に対する心臓、及びムードへの影響を調べることが出来る。さらにストレスを与える間に、血圧とムードの変化を同時に測定することを目的としている。このことは、文献に既にストレスに対する反応性は、病気に関係すると記されている事に<sup>も</sup>なっている。

プロトコルは、次に示す通りである。

1. 血圧計のバンドの装着。
2. 質問。
3. ストレスⅠ：
  - (a) ベースライン
  - (b) ムード自己レポート。

## 特開昭61-267526 (18)

### 2. "活性物質"の成分

東インドナツメグ油 . . . . . 97.10 %  
 メイスエキス . . . . . 0.14 %  
 ネロリ油 . . . . . 0.98 %  
 ジエチルフタレート . . . . . 0.44 %  
 インド吉草油 . . . . . 0.05 %

### 3. フレイグランス + "活性物質"

フレイグランス "A" . . . . . 60.0 %  
 "活性物質" . . . . . 40.0 %

### 4. "中性"フレイグランス

ジエチルフタレート . . . . . 100.0 %

### 5. "中性"フレイグランス + "活性物質"

ジエチルフタレート . . . . . 50.0 %  
 フレイグランス "A" . . . . . 10.0 %  
 "活性物質" . . . . . 40.0 %

この実験の被験者は、コネチカット州ニューヘブン近辺から選び、120人の被験者を4つのグループに分画し、それぞれ30人のグループとした。又実験は、二重ブラインド(担当者及び被験者が共に、サンプルについての情報が与えられ

- (c) 低いストレスを与える6つの質問(LS1)。
- (d) ムード自己レポート。
- (e) 穏かな(少し高い)ストレスを与える6つの質問(MS1)。
- (f) ムード自己レポート。
- (g) ベースライン。
- (h) ムード自己レポート。
4. トリートメント：
  - (a) フレイグランス "A"、又は
  - (b) フレイグランス "A" + "活性物質"、又は
  - (c) "中性"フレイグランス、又は
  - (d) "中性"フレイグランス、+ "活性物質"。
5. ストレスⅡ：
  - (a) ベースライン。
  - (b) ムード自己レポート。
  - (c) 低いストレスを与える6つの質問(LS2)。
  - (d) ムード自己レポート。
  - (e) 穏かな(少し高い)ストレスを与える6つの質問(MS2)。



## 特開昭61-267526 (19)

(f) ムード自己レポート。

(g) ベースライン。

(h) ムード自己レポート。

## 6. 実験後の質問。

## 7. 記録計の取りはずしと実験終了の指示。

最初の質問は、マルロウエークラウン (Marlowe-Crowne) の抑圧度テストと、テイラー (Taylor) の不安度スケールのベンディグ (Bendig) 形式から取った53の正しいか間違いかの質問を与える。これは、被験者を抑圧度と不安度から分離する為に用いられる。ベースラインの間には、被験者は静かに坐り、気楽にしている。ムード自己レポートは、被験者自身により7段階(0-6)によって自分のリラックス度、怒りの度合、不安度、幸福感、緊張感、当惑の度合、鎮静度、恐れ、及び眠けの度合を記録する。低いストレスを与える質問、及び種かな(少し高い)ストレスを与える質問は、相関連テスト (Phase Association Test) から選ばれている (Mandler ら、"Response to Threat: Relations Among Verbal and Physiological

Findings", Psychological Monographs, Vol.

75, No. 9, 1961)。被験者は出来るだけ速く与えられた質問に、最初に頭に浮んだ文を答える様に求められている。低いストレスを与える質問としては、"あなたの名前は"等が与えられる。種かな(少し高い)ストレスを与える質問としては、"自分自身で一番好まない点は..."、或いはもし自分の子供が異なった人種の人とデートをしていたら、私は..."という様な質問がされる。

検査期間中では、被験者は"メジャリングライン" (Measuring Line) タイプの香料用プロッター (臭いを嗅ぐ為の紙) (Frank Orlandi, Inc: 製、Long Island City, New York) からフレイグランス、又は既に述べたストレスに対する反応性を減少する物質を嗅ぐ。プロッターは長さ約15cm、巾1.4cmで、これをフレイグランス及び、又はストレスに対する反応性を減少する物質の20%エチルアルコール溶液に、約2cm浸し、5分間

最後の質問は、実験に対する被験者の反応を聞いた。

得られた結果を分散分析すると、フレイグランス "A" と "活性物質" の混合物、又は "中性" フレイグランスと "活性物質" の混合物を嗅いだ被験者は、フレイグランス "A"、又は "中性" フレイグランスだけを嗅いだ被験者に比べて、収縮期血圧と自己レポートに有意な変化を示していた。

日常生活におけるストレスや人生での緊張に関係すると考えられるのは、低いストレスを与える質問と種かな(少し高い)ストレスを与える質問との間での、血圧とムードの変化 (MS-LS) である。特定の条件による変化度は、条件を与える前と後での変化を比べればよい。従って、

フレイグランス "A" 又は "中性" フレイグランスによる変化 (N) は、

$$N = (MS2 - LS2) - (MS1 - LS1)$$

により求められる。

同様に、フレイグランス "A" と "活性物質"

との混合物、又は "中性" フレイグランスと "活性物質" との混合物による変化度 (A) を求めることが出来る。或る条件と他の条件下との間の変化度は、それぞれの条件下での値の差を見ればよい。従って "活性物質" の効果は (A-N) で表わされる。

表7は、"活性物質" の効果を、フレイグランス "A" と "活性物質" の混合物及び "中性" フレイグランスと "活性物質" の混合物による結果を合わせたもの (A) と、フレイグランス "A" と "中性" フレイグランスによる結果を合わせたもの (N) から得られる結果をまとめたものである。

結果の変量分散分析では、表7に示された変化量は、"活性" 三変量相互作用による試験期間を数量的に表わしたものである。かゝる情況で、"期間" とは試験前の効果に対する試験後の効果の平均である。すなわちすべての4つの試験の平均 (LS2 + MS2) - (LS1 + MS1) である。"試験" は低ストレスによる効果に対するお

## 特開昭61-267526 (20)

だやかなストレスによる効果の平均、すなわち、すべての試験についての平均 (MS1 + MS2) - (LS1 + LS2) である。"活性"は活性物質を含まない組成物についての効果に対する活性物質を含む組成物についての効果の平均である。すなわちフレイグランス "A" + "活性" および中性フレイグランス + "活性" についての平均 (LS1 + LS2 + MS1 + MS2) マイナスフレイグランス "A" および中性フレイグランスについての平均 (LS1 + LS2 + MS1 + MS2) である。

表 7. "活性物質" の種かな (少し高い) ストレスに対する効果

変 量	変化 (A-N)	有意レベル (P)
収縮期血圧	-4 mmHg	0.08
鎮 静 度	0.77	0.01
当 惑 度	-2.31	0.03
幸 福 感	0.77	0.0003
怒りの度合	-0.51	0.03

験者が実験に使われ、7人ずつの2つのグループとした。質問の内容はテープレコーダーで与えられ、血圧は、実施例2に述べた自動脈搏血圧記録計でもって測定した。実験のプロトコールは次の様である。

1. 血圧計のバンドの装着。
2. 質問。
3. ストレス I :
  - (a) ベースライン (BL1)。
  - (b) ムード自己レポート。
  - (c) 低いストレスを与える6つの質問 (LS1)。
  - (d) ムード自己レポート。
  - (e) 種かな (少し高い) ストレスを与える6つの質問 (MS1)。
  - (f) ムード自己レポート。
4. トリートメント :
  - (a) フレイグランス "A" (F)、又は
  - (b) "活性物質" (F)。
5. ストレス II :
  - (a) ムード自己レポート。

従って、"活性物質" がフレイグランス "A"、或いは "中性" フレイグランスに存在することにより、収縮期血圧が下がり、鎮静度及び幸福感が増加し、当惑度及び怒りの度合が減少している。この場合、主観的な効果が量的に示されただけではなく、収縮期血圧の変化と関係付けられたことは重要である。

## 実施例 3 (A)

2段階の臭いの条件について、要因分析実験法を用いてテストを行った。結果の分析は、1変量分散分析で行った。要因 (ファクター) は、フレイグランス "A" とストレスに対する反応性を減少させると考えられる物質で、レベルは、"活性物質" の有無である。統計分析法の詳細は、実施例2に述べた通りである。

テストされた物質は、フレイグランス "A" と "活性物質" で、それらの成分は実施例2に述べた通りである。

この実験で使った被験者は、ニュージャージー州のユニオンビーチ近辺から選んだ。14人の被

- (b) 低いストレスを与える6つの質問 (LS2)。
- (c) ムード自己レポート。
- (d) 種かな (少し高い) ストレスを与える6つの質問 (MS2)。
- (e) ムード自己レポート。
- (f) ベースライン (BL2)。

## 6. 実験後の質問。

## 7. 記録計の取りはずしと実験終了の指示。

プロトコールの細かい点については、実施例2に示してある。トリートメントの間、被験者はフレイグランス、或いはストレスに対する反応性を減少させる物質を、ウィック (心材) を備えた1/8オンス瓶に入れられた60%テスト物質と40%食品用エチルアルコールからなる溶液として嗅ぐことになる。

実験は、ストレッチャーとフレイグランス、又はストレスに対する反応性を減少させる物質の収縮期血圧に対する効果を示すことにある。ストレッチャーは、種やかなフラストレーションと緊張度を生ずる様にデザインされている。被験者は、議論

## 特開昭61-267526 (21)

の種になる様な質問や複雑な答を必要とする質問に、充分答える時間は与えられていない。

図3は、このプロトコル期間での、収縮期血圧の変化を示したものである。フレイグランス、又はストレスに対する反応性を減少する物質を与える前の期間では、穏かな(少し高い)ストレスを与える質問は、低いストレスを与える質問に較べて、約5mmHgの血圧の上昇を起している(MS1-LS1)。フレイグランス、又はストレスに対する反応性を減少する物質を与えた後では、“活性物質”を嗅いでいる被験者グループは、穏かな(少し高い)ストレスを与える質問の間では、低いストレスを与える質問中に較べて、1mmHgの収縮期血圧の低下を示したが、フレイグランス“A”を嗅いだ被験者グループでは、同じ期間に8mmHgの血圧上昇を示している(MS2-LS2)。

“活性物質”を嗅いだグループのフレイグランス“A”を嗅いだグループに対する変化の差は次の様になる。

## “活性物質”のグループ

$$A = (MS2 - LS2) - (MS1 - LS1) \\ = -1 - 5 = -6 \text{ mmHg}$$

## 非活性物質のグループ

$$N = (MS2 - LS2) - (MS1 - LS1) \\ = 8 - 5 = 3 \text{ mmHg}$$

## 変化の差

$$A - N = -6 - 3 = -9 \text{ mmHg} (p = 0.03)$$

この差の値は、前半の部分の実験で収縮期血圧が増加したものが、“活性物質”により穏かな(少し高い)フラストレーションを受ける時に、減少したことを示している。フレイグランス“A”は、この効果を示していない。

## 実施例3(B)

73才の男の被験者に、この発明で好ましい香料を用いてテストした。香料の成分は、60%フレイグランス“A”と40%“活性物質”(実施例2参照)からなる。香料の与え方は、前例に示したウィックを備えた瓶で行った。テストのプロトコルは実施例3に記載したものでありまたプ

ロトコル期間(BL1, LS1, MS1, P, LS2, MS2及びBL2)は、実施例3(A)に示したのと同じである。図4に被験者の収縮期血圧の変化を、それぞれの期間についてライン8.1として示してある。グラフ曲線は、図3の“活性物質”を嗅いだグループの曲線(7.2)と同様なパターンを示している。特に注目されるのは、LS1とMS1、及びLS2とMS2の間での収縮期血圧の変化である。この被験者は、香料を嗅ぐ前の期間の収縮期血圧(MS1-LS1)の増加は、6mmHgであったが、香料を与えた後では、同じ期間(MS2-LS2)に8mmHgの収縮期血圧の減少を示した。従って変化の差は、次の様に計算される。

$$A = (MS2 - LS2) - (MS1 - LS1) \\ = -8 - 6 = -14 \text{ mmHg}$$

この実施例は、“活性物質”成分が人間のストレスに対する反応性を下げている事を示している。実施例4(A)

2段階の臭いの条件について、要因分析実験法

を用いてテストした。結果の分析は、1変量分散分析で行った。要因(ファクター)は、エチルアルコールと水の混合物と、エタノールと“活性物質”の混合物であり、レベルは、“活性物質”の有無である。統計分析法の詳細は、実施例2に述べた通りである。テストされた物質は、エチルアルコールと水の混合物と、エチルアルコールと“活性物質”の混合物であり、“活性物質”の成分は実施例2で述べた通りである。

この実験に使った被験者は、ニュージャージー州のユニオンビーチ付近から選んだ。30人の被験者が実験に使われ、15人ずつの2つのグループとした。質問の内容は、テープレコーダーで与えられ、血圧は、実施例2で述べた自動脈搏血圧記録計をもって測定した。実験のプロトコルは次の様であった。

1. 血圧計のバンドの装着。
2. 質問。
3. ストレス1:

(a) ベースライン(BL1)。

## 特開昭61-267526 (22)

- (b) ムード自己レポート。  
 (c) 種かなストレスを与える12の質問 (VB1)。  
 (d) ムード自己レポート。  
 (e) 連続計算演習 (MB1)。  
 (f) ムード自己レポート。  
 4. トリートメント:  
 (a) エチルアルコール/水 (E)、又は  
 (b) エチルアルコール/“活性物質” (E+)。  
 5. ストレスII:  
 (a) ベースライン (BL2)。  
 (b) ムード自己レポート。  
 (c) 種かなストレスを与える12の質問 (VB2)。  
 (d) ムード自己レポート。  
 (e) 連続計算演習 (MB2)。  
 (f) ムード自己レポート。  
 6. 実験後の質問。  
 7. 記録計の取りはずしと実験終了の指示。

最初の質問は、練習用のムード評価と、実験の中心となる部分とは関係のない種々の質問から成っている。ベースラインの期間では、被験者は静

かに休んだ状態にしている。ムード自己レポートは被験者自身により、10段階 (0-9) のスケールでリラックスの度合、怒りの度合、不安度、幸福感、緊張度、当惑度、鎮静度、退屈度、興奮度を評価する。種かなストレスを与える質問は、実施例2で述べたものと同じである。連続計算演習は、被験者に、“0より5を足して行って下さい”という風な指図がされ、答を書き込む様子を要請される。被験者達は、あらかじめ正解数によってボーナスが与えられる事が伝えられている。

トリートメント期間の始めに、被験者はテストサンプルを、ウィックを備えた1/8オンスの瓶でもって60%テスト物質及び40%食品用エチルアルコールの混合物として嗅ぐ。ストレスIIの期間中ずっとそれを嗅ぐ様にしてある。

このプロトコールでは、実施例2に較べてもう少しストレスが高くなる様にしてある。連続計算は、測定し得る仕事能率となる様にデザインされている。

実験後の質問は、マルロウエークラウン/ティ

ラー (Marlowe - Crowne/Taylor) 不安度スケール、及び被験者のこの実験に対する反応を聞く質問になっている。

2組の変化値が、実施例2及び3で示されたと同様な方法で、この実験から計算される。最初にはベースラインと言語によるストレスの間の差で、第2は、ベースラインと計算によるストレスの間の差で、それぞれ次の様になる。

$$VB \text{ 変化} = (VS2 - BS2) - (VS1 - BS1)$$

$$MB \text{ 変化} = (MS2 - BS2) - (MS1 - BS1)$$

従って効果を“活性物質”での変化量と水での変化量の差として計算される。有意度は、実施例2で述べたと同じ様に、3変量分散分析で求めた。

表8. ストレスに対する“活性物質”の効果

変 量	VB変化量差	有意度 (p)	MB変化量差	有意度 (p)
収縮期血圧BP	-6.2mmHg	0.03	-1.5mmHg	0.62
弛緩期血圧BP	-6.7mmHg	0.05	-6.4mmHg	0.09
リラックス度	1.1	0.11	1.6	0.04
不安度	-1.1	0.12	-3.1	0.002
緊張度	-1.6	0.08	-2.3	0.06
困惑度	-0.7	0.45	-1.5	0.04
退屈度	1.9	0.06	2.4	0.06

ストレッサーによっては、有意度は変化するが“活性物質”が存在することにより、収縮期血圧及び弛緩期血圧が共に下がり、リラックス度は上り、退屈度も上がるが、不安度、緊張度、困惑度は共に下がった。

#### 実施例4 (B)

2段階の臭いの条件について実施例4 (A) と

## 特開昭61-267526 (23)

同じ方法でテストした。トリートメントは、フレイグランス“A”とフレイグランス“A”と“活性物質”の混合物であった。これらの成分については、実施例2に記した通りである。

この実験に使った被験者は、ニュージャージー州のユニオンビーチ付近から選んだ。35人の被験者を用い、19人がフレイグランス“A”を与えられ、16人がフレイグランス“A”と“活性物質”の混合物を与えられた。

それぞれの変化値及び統計的有意度は、実施例4(A)と同じ様に計算された。従って効果は、フレイグランス“A”と“活性物質”の混合物での変化量と、フレイグランス“A”での変化量の差として計算した。

表9. ストレスに対するフレイグランス“A”と“活性物質”の混合物の効果

変 量	VB変化量差	有意度 (p)	VB変化量差	有意度 (p)
収縮期血圧BP	-2.6mmHg	0.39	-5.2mmHg	0.18
弛緩期血圧BP	-1.5mmHg	0.49	-7.2mmHg	0.04
怒りの度合	-1.0	0.05	-1.0	0.05
不 安 度	-1.2	0.04	-0.3	0.70
幸 福 感	0.8	0.27	1.1	0.13
緊 張 感	-2.0	0.04	-1.5	0.13

従って、“活性物質”の存在により血圧が下がり、幸福感を増し、不安度、緊張度、怒りの度合を下げている。この例により“活性物質”が人間のストレスを減少している事をさらに示している。

#### 実施例4(C)

2段階の臭いの条件について実施例4(A)と同じ方法でテストをした。トリートメントは、フレイグランス“F”とフレイグランス“F”と

“活性物質”の混合物である。

これらの成分は次に示す通りである。

#### 1. フレイグランス“F”

イソボルニルアセテート . . . . . 19.42%  
 シーダーウッド油 . . . . . 20.65%  
 ボルニルアセテート . . . . . 6.75%  
 バイン油 . . . . . 6.50%  
 ヘキサヒドロ-4, 7-メタノインダン  
 -5 (又は6) -イルプロピオネート  
 . . . . . 3.50%  
 アセト酢酸エチル . . . . . 2.50%  
 α-テルピネオール . . . . . 2.38%  
 メチルノニルアセトアルデヒド . . . . . 1.56%  
 リナロール . . . . . 1.62%  
 クマリン . . . . . 1.25%  
 ジプロピレングリコール . . . . . 33.86%

#### 2. フレイグランス“F” + “活性物質”

フレイグランス“F” . . . . . 60.00%  
 “活性物質” (実施例2に記載) . . . . . 40.00%

この実験に使った被験者は、ニュージャージー州ユニオンビーチ付近から選んだ。65人の被験者を用い、33人がフレイグランス“F”を与えられ、32人がフレイグランス“F”と“活性物質”の混合物を与えられた。

それぞれの変化値及び統計的有意度は、実施例4(A)と同じ様に計算された。従って効果は、フレイグランス“F”と“活性物質”の混合物での変化量と、フレイグランス“F”での変化量の差として計算した。

表10. ストレスに対するフレイグランス“F”と“活性物質”の混合物の効果

変 量	VB変化量差	有意度 (p)	VB変化量差	有意度 (p)
収縮期血圧BP	-3.1mmHg	0.20	-3.2mmHg	0.16
弛緩期血圧BP	-4.0mmHg	0.03	-4.5mmHg	0.04
鎮 静 度	1.4	0.04	1.7	0.04

特開昭61-267526 (24)

従って、“活性物質”の存在により血圧が下がり、鎮静感が増加している。

## 実施例5

実施例2、3、4で行なった実験を、“活性物質”として、各々次に掲げる比較的純粋な物質を用いて行う。

- (1) 東インドナツメグ油
- (2) ネロリ油
- (3) メイスエキス
- (4) 吉草油
- (5) ミリスチシン
- (6) エレミシン、及び
- (7) イソエレミシン

実施例2、3、及び4で得られた結果とほぼ同じ結果が、“活性物質”の代りに各々の比較的純粋な物質を用いても得られる。

以下の実施例6では、次に掲げる物質が付香製品に用いられ、それらの付香製品を使用することにより、種かなストレスに対する反応性を減少する効果が得られる。

と、50:50の重量比で混合すると、フレイグランス“A”のりんご様の香りが変化され、化粧パウダーに用いる事が出来る。

## 実施例7

## コロソ及びハンカチ用香水の調製

95%の水性エチルアルコールに、表8の各々の物質を2%、2.5%、3.0%、3.5%、4.0%、4.5%、5.0%の濃度で加え、同時に実施例2におけるフレイグランス“A”を4.0%、4.5%及び5.0%の濃度で加え、種々の濃度と組合わせのコロソを調製する。又、95%の水性エチルアルコールに、表8の各々の物質を15%、20%、25%、30%及び40%の濃度で加え、さらに実施例2におけるフレイグランス“A”を10%の濃度で加え、ハンカチ用香水とする。それぞれのコロソ及びハンカチ用香水は、少しずつ異なりんごの香りがし、それぞれのコロソ、ハンカチ用香水は、使用者のストレスに対する反応性を減少させる効果を与える。

## 実施例8

表 11

1. 実施例2の“活性物質”
2. 比較的純粋な東インドナツメグ油
3. 比較的純粋なメイスエキス
4. ネロリ油
5. 吉草油
6. ミリスチシン
7. エレミシン
8. イソエレミシン

## 実施例6

## 化粧パウダーの調製

100gのタルクと0.25gの表8に示される物質を各々加え、ボールミルで混合することにより、化粧パウダーを調製する。それぞれの化粧パウダーは、使用者のストレスに対する反応性を減少させると考え得る効果を生ずる。

表8の物質1~8を各々フレイグランス“A”

## デオドラントステック

デオドラントステック組成品を次に記す試薬をもって調整した。

成 分	重量部
・プロピレングリコール	68.00
・ステアリン酸ナトリウム	7.00
・落留水	23.75
・IRGASAN <sup>®</sup> DP-300 (2,4,4-トリクロロ-2'-ヒドロキシジフェニルエーテル、Ciba-Geigyの製品でその商標)	0.25
・フレイグランス“A”(0.5重量部)と表8の1~8の内の1つの物質(0.5重量部)	1.00

フレイグランス“A”と“活性物質”の混合物を除いて、他の成分を混ぜ、75℃に加熱する。これらの成分は、ステアリン酸ナトリウムが溶けるまで攪拌加熱する。得られた混合物を40℃に冷却し、フレイグランスと“活性物質”(表8の

## 特開昭61-267526 (25)

ストレスに対する反応性を減少する物質から選んだ一つ)の混合物を加え、懸濁液が出来るまで40℃で攪拌する。

得られた懸濁液をデオドラントステックにする。これを使用する事により、ストレスの与えられる条件にある使用者の生理的及び、又は主観的なストレスに対する反応性を減少させる。

## 実施例9

## 固形室内デオドラント製品

固形の室内デオドラント製品を次の様にして調製した。

成 分	重量部
<b>A部:</b>	
蒸留水	88.45
<u>ラウリン AFG 15</u> (GELCARIN AFG 15) (マリンコロイド (Marine Colloids)) (1)	3.00
ホルムアルデヒド	0.05
<b>B部:</b>	
グリセリン	3.50
<b>C部:</b>	
フレイグランス "A" (0.5重量部) と表8 の1~8から選ばれた一物質 (0.5重量部)	1.00
<b>D部:</b>	
<u> Tween 80</u> (TWEEN 80) (ICIアメリカンス) (2)	4.00

1. 水を85℃に加熱し、ラウリン AFG 15 (GELCARIN AFG 15)を懸濁する。
2. 温度を85℃に保ちながら、グリセリンをゆっくりと加える。

(Wilmington, Delaware 19897) の製品。

## 実施例10

## ボディオイル

ボディオイル組成品を次の様にして調製した。

成 分	重量部
・ミネラルオイル (KLEAROL (Wilco))	45.0
・ミリスチン酸イソプロピル	50.0
・フレイグランス "A" (2.5重量部) と表8 の1~8の中から選ばれた1つの物質 (2.5重量部)	5.0

ボディオイルは、上記の成分を混合、攪拌し、口過して調製する。

表8の1~8の物質を用いて調製されるボディオイルは、使用者にストレスに対する反応性を減少させると考えられる効果を生ずる。それに加えて好ましいりんごの香りがそれぞれの調製品に与えられる。

3.  Tween 80 (TWEEN 80)とフレイグランス "A" と "活性物質" の混合物を混ぜる。
  4. 得られた混合物に  Tween 80 (TWEEN) / (フレイグランス + 活性物質) 組成物を加える。
  5. ホルムアルデヒドを加える。
  6. 得られた混合物を、型に流し込む。
- 冷却した後、型をはずし、固形のケーキを取り出し、標準的な室内デオドラント容器に入れる。
- 室内デオドラライザーとして、標準的に用いると4分間後に室内に気持のよいりんごの芳香が広がり、その部屋に居るストレスの与えられる条件にある人の、ストレスに対する反応性がかなり減少される。

注: (1) ラウリン AFG 15 (GELCARIN AFG 15)は、Marine Colloids, Inc. Division of PMC Corporation (Springfield, New Jersey 07081)

の製造するカラギーナンである。

(2)  Tween 80 (TWEEN 80)はポリソルベート80、又は (ポリエチレングリコール)、-ソルビタンオレートで、ICI Americas Inc.

## 特開昭61-267526 (26)

## 実施例 11

## 毛髪用加熱オイルトリートメント

毛髪用の加熱オイルトリートメントを次の成分から調製した。

成 分	重量部
エフシ ・(UCON) 50-BB-660 <sup>(1)</sup> (ユニオンカーバイド製)	65.9
エフシ ・(UCON) 50-HB-400 <sup>(2)</sup> (ユニオンカーバイド製)	30.0
ランترول AMS ・(LANTROL AMS) <sup>(3)</sup>	3.0
・プロピルパラベン	0.1
・フレイグランス "A" (0.5重量部) と表 8 の 1~8 から選ばれた 1 つの物質 (0.5重量部)	1.0

上に掲げた成分を、記載された順序で攪拌しながら加えて調製する。

表 8 のそれぞれの物質を用いて調製した毛髪用加熱オイルトリートメントは、使用者にストレスに対する反応性を減少させると考えられる効果を生ずる。それに加えて好ましいりんごの香りがそれぞれの調整品に与えられる。

成 分	重量部
・スパン 80 (SPAN 80)	1.00
・フレイグランス "A" (0.125 重量部) と表 8 の 1~8 の中から選ばれた 1 つの物質 (0.125 重量部)	0.25
・蒸留水	68.75
・プロベラント A-46 <sup>(2)</sup>	30.00

室内エアスプレーを、次の様にして調製する。

1. エアスプレー缶に水を入れる。
2. フレイグランス "A" と "活性物質" の混合物 (SPAN 80) と混ぜる。
3. 容器にフレイグランス / "活性物質" / スパン 80 組成物を入れる。
4. 缶の蓋を密封する。
5. プロベラント A-46 で加圧する。
6. バルブにノズルを付ける。


得られたエアスプレーを用いて、内容物を普通の換気条件の 20' x 20' x 10' の部屋 (T = 18℃) (65°F) に噴霧すると、部屋に 4

注: (1) (UCON) 50-HB-660 は、(ポリプロピレングリコール) - 2-ブチルエーテルで、Union Carbide (Danbury, Connecticut 06817) の製品。  
(2) (UCON) 50-HB-400 は、(ポリプロピレングリコール) - 2-ブチルエーテルで、Union Carbide (Danbury, Connecticut 06817) の製品。  
(3) (LANTROL AMS) は、水に懸濁するアルコキシル化されたラノリンで、Emery Industries (Cincinnati, Ohio 45202) の製品。

## 実施例 12

## 室内エアスプレー

室内エアスプレーを次に掲げる成分を用いて調製する。



分間後快よりりんごの香りが広がり、その部屋に居るストレスの与えられる条件にある人のストレスに対する反応性を、かなり減少する。

## 注

- 1) スパン 80 (SPAN 80) は ICI Americas Inc. Wilmington, Delaware 19897 製である。
- 2) プロベラント A-46 は 85 重量% イソブタンと 15 重量% プロパンとの混合物である。

## 4. 図面の簡単な説明

図 1 は、実施例 1 (B) に述べられた方法で得られた、東インドナツメグ油のヘッドスペースのガスクロマトグラムを示した図である (ガスクロマトグラフィーの条件: OV-1 フェーズドリカラム使用、プログラム 75~220℃、2℃/min)。

図 2 は、実施例 1 (A) の方法で東インドナツメグ油を 2 度蒸留し、その蒸留区分 7~12 を合わせたもののガスクロマトグラムを示した図で



## 特開昭61-267526 (27)

ある。(ガスクロマトグラフィーの条件:<sup>122-X 0. P cm</sup>400  
×0.032"カルボウックス-フューズドシリカ  
(Carbowax-fused silica) カラム使用、プログ  
ラム-75~220℃、2℃/min)。

図3は、次のストレス条件下の人間の血圧変化  
にあたえる効果を示した図である。血圧の変化は  
mmHg単位で示した。

(I) 実施例3のプロトコールに従って実施例2  
に記載された活性物質の組成物によるもの。

(II) 実施例2に特に記載されたフレイグランス  
"A"といわれるフレイグランス組成物によ  
るもの。

グラフ曲線7.1は、"活性物質"、即ちナツメ  
グ油、メイスエキス、ネロリ油、及び吉草油を  
含まないフレイグランス"A"について、収縮期  
血圧を実施例2で定義されたプロトコール期間  
(即ち、BL1、LS1、MS1、F、LS2、  
MS2、及びBL2)に対しての変化を示したも  
のである。プロトコール期間は、次の様である。

BL1-ストレスIのベースライン。

LS1-ストレスIの低いストレスを与える6  
つの点。

MS1-ストレスIの種かな(少し高い)スト  
レスを与える6つの点。

F-ストレスIとストレスIIとの間で、フ  
レイグランス"A"を与え、血圧を2  
度測定する。

LS2-ストレスIIの低いストレスを与える6  
つの点。

MS2-ストレスIIの種かな(少し高い)スト  
レスを与える6つの点。

BL2-ストレスIIの終りのベースライン。

グラフ曲線7.2は、実施例2での"活性物質"、  
即ちナツメグ油、メイスエキス、ネロリ油、及  
び吉草油の混合物を用いた時の、収縮期血圧をプ  
ロトコール期間に対してグラフにしたものである。  
プロトコール期間は、上に述べたものと殆んど同  
じであるが、期間Fにおいてフレイグランス"A"  
の代りに、ストレスに対する反応性を減少させる  
"活性物質"を与える。

図4は実施例3のプロトコールによる活性組成  
物のストレス条件下におかれた人間に対する血圧  
効果をフレイグランス"A"のフレイグランス組  
成物との協働下で示した図である。ここで血圧は  
実施例4に記載の方法で測定し、単位はmmHgであ  
る。

曲線8.1はフレイグランス"A"と活性物質す  
なわちナツメグ油、メイスエキス、ネロリ油、  
および吉草油の組成物について実施例4に記載の  
プロトコール期間(すなわちBL1、LS1、M  
S1、F、LS2、MS2およびBL2)に対す  
る収縮期血圧(mmHg)のグラフである。

図5は本発明の人間のストレスに対する生理的  
及び、又は主観的反応性を減少させる活性物質を  
含む組成物を作るのに使用する装置の側面図であ  
る。

図6は図5の装置の矢印の方向の前面図である。

代理人 三 宅 正 夫 他1名

特開昭61-267526 (28)




図1. 実施例1の蒸留成分7-12を合わせたもののガスクロマトグラム

図面の添書(内容に変更なし)




図2. ナフタレンジのヘキドスベースガスクロマトグラム

特開昭61-267526 (29)




図3. 血圧への効果【実施例3(A)】





図4. 血圧への効果【実施例3(B)】

特開昭61-267526 (30)



第1頁の続き

⑩Int.Cl. <sup>4</sup>		識別記号	庁内整理番号
A 61 K	31/12 31/335 31/35	ABU	7330-4C
// C 07 C	43/215	AAE	7330-4C 7419-4H 7822-4C
C 07 D	317/64		

優先権主張

⑩1985年4月2日⑩米国(US)⑩719234

⑩発明者	マリナ アリス ムン テニユ	アメリカ合衆国、ニューヨーク、ニューヨーク、イースト シックスティーフォース ストリート 301番地
⑩発明者	ゲーリー イー. シュ ワルツ	アメリカ合衆国、コネチカット、ギルフォード、コロニア ル ロード 326番地
⑩発明者	カルロス ビネイム	アメリカ合衆国、ニューヨーク、ハーツ デール、ウイン ザー マンション (番地なし)
⑩発明者	ヘンリー ジイ. ウオ ルター, ジュニア	アメリカ合衆国、ニューヨーク、ミル ネット、オイスタ ー ベイ ロード (番地なし)
⑩発明者	ロナルド エス. レイ ト	アメリカ合衆国、ニュージャージー、アバーディーン、キ ャロル レーン 10番地
⑩発明者	ドナルド アーサ, ウイティコム	アメリカ合衆国、ニュージャージー、リンクロフト、ロジ ヤー アベニュー 10番地
⑩発明者	ブラジャ デュラル ムークハーザー	アメリカ合衆国、ニュージャージー、ホルムデル、チエス ナット ロード 46番地
⑩発明者	ロバート ウォルター トレンケル	アメリカ合衆国、ニュージャージー、ブリックタウン、ロ ーレルウッド ロード 130番地

特開昭61-267526 (31)

④出 願 人 エール ユニバーシテ アメリカ合衆国、コネチカット、ニューヘブン、カレッジ  
イ ストリート 451番地

## 手 続 補 正 書 (方 式)

昭和61年2月7日

特許庁長官 宇賀道郎 殿

## 1. 事件の表示

昭和60年特許願第253896号

2. 発明の名称 ストレスを与える条件下におかれた人間の  
ストレスに対する生理的及び、又は主  
3. 補正をする者 観的反応性を減少させる方法  
事件との関係 特許出願人  
氏 名 (名称) インターナショナル フレイバース アンド  
フレグランシス インコーポレイテッド (他1名)

## 4. 代 理 人 〒100

住 所 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号  
有楽町電気ビル506号室電話(212)7830番  
氏 名 (5930)弁理士 三宅正夫(他1名)

5. 補正命令の日付 昭和61年1月8日

6. 補正により増加する発明の数 0

7. 補正の対象

図面(第2図)

8. 補正の内容

特許庁  
61.2.7  
61.2.7  
61.2.7

## 手 続 補 正 書 (自 発)

昭和61年6月20日

特許庁長官 宇賀道郎 殿

## 1. 事件の表示

昭和60年特許願第253896号

2. 発明の名称 ストレスを与える条件下におかれた人間のストレス  
に対する生理的及び、又は主観的反応性を減少させ  
3. 補正をする者 る方法  
事件との関係 特許出願人 方 式 (H)  
希 査 (H)  
氏 名 (名称) インターナショナル フレイバース アンド  
フレグランシス インコーポレイテッド (他1名)

## 4. 代 理 人 〒100

住 所 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号  
有楽町電気ビル506号室電話(212)7830番  
氏 名 (5930)弁理士 三宅正夫(他1名)

5. 補正命令の日付 自発

6. 補正により増加する発明の数 0

7. 補正の対象

図面 (第1図及び2図)の図者

8. 補正の内容

特許庁  
61.6.20  
61.6.20  
61.6.20

特開昭61-267526 (32)

(1) 別紙の通り、第1図及び2図を夫々第2図及び1図に図番訂正する。




図1. ナツメグ油のヘッドスペースガスクロマトグラム

1




図2. 実施例1の蒸留成分7-12を合わせたもののガスクロマトグラム

2